

## VEJLEDNING

### Sådan får du en flot natureng med flerårige frøblandinger<sup>1</sup>

For at opnå et godt resultat kan du med fordel følge denne guide til etablering af frøblandinger:

1. Kultivér først jorden til et godt så-bed. Jorden bør enten pløjes eller fræses. Hvis der er et tæt græsdække kan det give et bedre resultat, at fjernes græstørven først. Hvis der er plads på arealet, kan man lave en jordvold eller en lille bakke ud af tørven. Det er vigtigt at græsset hindres i at vokse videre efter jordbehandling, da det hurtigt vil udkonkurrere de blomstrende urter.
2. Gør jorden plan med en rive, og fjern større sten, rødder og lignende.
3. Så herefter den anbefalede frømængde (individuel for hver blanding). Bland gerne frøblandingen op med tørt sand for nemmere at kunne fordele frøene jævnt over arealet.
4. Bind frøene til jordoverfladen med en tromle eller ved at stampe jorden.
5. Vand eventuelt de spirende frø i tørre perioder (ikke påkrævet).
6. Fjern evt. løbende uønskede arter, f.eks. nælder, kvikgræs, gråbynke.
7. Nyd din blomster- eller græseng sommeren over, og lad den stå vinteren over, for at tilbyde levesteder for insekterne og slå den først i det tidlige forår. Alternativt kan du slå/klippe i arealet i september/oktober i ca. 10 cm's, højde, så der stadig er lidt plantemateriale tilbage til overvintrende insekter. Fjern det afslåede materiale. Således hæmmer du græsvækst og giver mere lys til fremspiring af blomsterfrø.
8. Det afslåede materiale kan evt. lægges på et nærliggende areal for at eventuelle overskydende frø kan spire her.

---

<sup>1</sup> Kilde: [Nykilde.dk](http://Nykilde.dk)

## Mere om pleje:

- **Ukrudtskontrol:** Uønskede arter er nok det største problem og der er ikke nogen særligt nemme løsninger. Ukrudtsfrø kan ligge i hvile i jorden i mange år. Når spiringsbetingelserne en dag er til stede, kan uønskede arter fremkomme i store mængder, f.eks. når et nyt areal tages under behandling. Ukrudtskontrol i 2 faser kan være nødvendigt. I første fase ved arealets fremspiring, hvor det mest generende kan fjernes.  
Etableringsåret er det vanskeligste, da det som regel er frøukrudt der kan dominere i etableringsåret. De vanskeligste rod ukrudtsarter er Gråbynke, Tidsel, Brændenælde og Kvik. Disse arter bør fjernes så vidt muligt før etablering eller løbende. Visse naturfrø er ret robuste og kan etablere eller "bide sig fast" i græsarealer der har henligget måske i flere år og som afklippes rutinemæssigt. Ved at undlade jord behandling bringes ingen spiredygtige frø op i det øverste lag.  
Er der stor konkurrence fra uønsket vegetation efter udsåning, så er det en god idé 6-8 uger efter udsåning at foretage den første klipping af arealet (plejesnit). Denne klipping kan efter behov (ved yderligere fremspirende ukrudt) gentages yderligere en eller to gange det første år. Det afklippede bør enten biklippes eller ved store mængder ukrudt helt fjernes fra arealet. Klip ikke længere ned end til 5 cm så man ikke beskadiger bladrosetterne på de nye vilde blomster og græsser.
- **Pleje af den eksisterende eng:** Klipping af engen i de efterfølgende år afhænger af område og ønsket plantebestand. På de fede og næringsrige jorder bør der klippes to til tre gange om året. Første klipping ved hovedblomstringen af græsserne, ca. midten af maj – begyndelsen af juni. Engarealer på mere magre og næringsfattige arealer kan klippes en gang om året, her er det bedste tidspunkt sidst på sommeren – begyndelsen af efteråret. Vejkanter kan, alt efter trafikforhold, også klippes en gang årligt, i slutningen af efteråret eller tidligt forår. Alt afklip skal fjernes fra arealet.  
For alle arealer gælder, at det kan være en god idé at lade noget stå vinteren over og hen på det tidlige forår, af hensyn til insekterne.